

**Producent:** STAHLER International GmbH & Co.KG, , Stader Elbrase D-21 -683 Stade, Niemcy, tel. 0049 (0) 4141 9204 70, fax: 0049 (0) 4141 9204 10

**Importer:** EUROFLORA Andrzej Otwiaska ul. Brzozowa 3B, 62-800 Kalisz , tel. (0-prefiks-62) 760 37 77, fax: (0-prefiks-62) 760 37 78, e-mail: otwiaska@euroflora.pl

## PARA SOMMER 75 EC

Środek przedziorkobójczy, adiuwant - środek wspomagający oraz nabłyszczacz liści w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym, przeznaczony do:  
A/ zwalczania przedziorków w uprawie drzew pestkowych w okresie wczesnowiosennym,  
B/ jako adiuwant - dodatek do cieczy użytkowej środka chwastobójczego Mogeton 25 WP  
C/ nabłyszczania liści roślin ozdobnych.

Na roślinie działa powierzchniowo.

Zawartość substancji biologicznie czynnej:

oleju parafinowego - 75%.

**Zezwolenie MRiGŻ Nr 395/98 z dnia 28.09.1998r.**  
**Zmienione decyzją MRiRW Nr R - 463/2003p z dnia 26.08.2003r.**  
**oraz decyzją MRiRW Nr R - 179/2004o z dnia 22.04.2004 r.**

Określenie toksyczności:

dla pszczoł - **szkodliwy**

dla organizmów wodnych - **bardzo toksyczny.**

(R50) Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.



**Uwaga:**

- 1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.**
- 2. Nie dopuścić do przedostania się środka do zbiorników i cieków wodnych.**

**ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI**

### **A/ Rośliny sadownicze**

Środek działa głównie jajobójczo, ale zwalcza również stadium larwy i pierwsze stadium nimfy. Nie działa na formy dorosłe.

#### **- drzewa pestkowe.**

-przędziorki.

-Zalecana dawka: 3 l/ha.

Opryskiwać od fazy pęknięcia pąków do początku fazy kwitnienia, najlepiej na początku wylegu larw z jaj zimowych, który zbiega się z końcem fazy zielonego pąka kwiatowego jabłoni.

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.

### **B/ Łączne stosowanie ze środkiem chwastobójczym Mogeton 25 WP**

-Zalecane stężenie: 1% /100 ml środka w 10 litrach wody).

Stosować łącznie ze środkiem Mogeton 25 WP (zgodnie z etykietą - instrukcją stosowania) do zwalczania glonów na powierzchni szkła i folii w szklarniach i tunelach foliowych (bez roślin).

### **C/ Rośliny ozdobne (pod osłonami)**

-nabłyszczanie liści.

-Zalecane stężenie: 1% (1000 ml środka w 100 litrach wody).

Środek zapewnia liściom naturalny i zdrowy połysk.

Rośliny przeznaczone do nabłyszczania podlać wodą, a następnie opryskać górną stronę liści z odległości 30 cm.

Zalecana ilość cieczy użytkowej 500-1000 l/ha w zależności od wysokości roślin.

### **UWAGI:**

1. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg celem sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
2. Nie opryskiwać w czasie kwitnienia roślin ze względu na niebezpieczeństwo wystąpienia plam.
3. Z uwagi na fitotoksyczność nie nabłyszczają liści krotonu.

**OKRES KARENCJI** (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji): **NIE DOTYCZY**

**OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ** (okres zapobiegający zatruciu): **NIE DOTYCZY.**

**OKRES PREWENCJI DLA LUDZI** (okres zapobiegający zatruciu): **NIE DOTYCZY.**

**OKRES PREWENCJI DLA ZWIERZĄT** (okres zapobiegający zatruciu): **NIE DOTYCZY.**

### **SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ**

Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

### **PRZECHOWYWANIE**

(S47/49) Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej 0° – 35° C.

### **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

(S1/2) Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

(S13) Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

(S20/21) Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.

(S23) Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.

(S26) W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

(S27) Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

(S28) W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody z mydłem.

(S36/37/39) Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary /ochronę twarzy.

(S46) W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.

Resztki niez użyt ej cieczy użyt kowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

#### **UWAGA**

**ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.**

(S45) W przypadku awarii lub jeśli źle się czujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

#### **ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.**

##### **Pomoc medyczna**

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (0-prefiks-58) 301 65 16  
44 09

Rzeszów – (0-prefiks-17) 866

Kraków - (0-prefiks-12) 411 99 99  
45

Sosnowiec – (0-prefiks-32) 266 11

Lublin – (0-prefiks-81) 740 26 76

Warszawa – (0-prefiks-22) 619 08 97

Łódź – (0-prefiks-42) 657 99 00

Wrocław – (0-prefiks-71) 343 30 08.

Poznań – (0-prefiks-61) 847 69 46

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji - .....

Zawartość netto - .....

Nr partii - .....