

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-151/2008 z dnia 14.11.2008 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr R-31/2006 z dnia 07.11. 2006 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Cintamani Poland Majewscy i Koć Sp.J.; ul. Młynarska 13
A lok. 90, 05-500 Piaseczno; tel.: (0-prefiks-22) 750 52 02; fax.: (0-prefiks-22) 735 01 69

***Przestrzegaj etykiety – instrukcji stosowania środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska***


BIOSEPT 33 SL

Środek grzybobójczy oraz wzmacniający system obronny roślin przed grzybami chorobotwórczymi w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie.

Środek zastosowany do opryskiwania lub podlewania roślin ozdobnych i warzywnych wprowadza do środowiska korzeni oraz na pędy związki, które hamują rozwój patogenów nalistnych i glebowych, a w przypadku pojawienia się czynnika chorobotwórczego mogą uodporniać rośliny na patogena.

Zawartość substancji aktywnej:
wyciąg z grejpfruta - 33%.

**Zezwolenie MRiRW Nr R-31/2006 z dnia 07.11. 2006 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-151/2008 z dnia 14.11.2008 r.**



Drażniący

Działa drażniąco na oczy.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa szkodliwie na organizmy wodne.



Uwaga!

- 1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody**
- 2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.**

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Rośliny ozdobne (pod osłonami):

chryzantema

- rdza biała

Zalecane stężenie: 0,1% (100 ml środka w 100 l wody).

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1 litr na 10 m² .

Opryskiwać rośliny po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, zabieg powtarzać kilkakrotnie co 7 dni.

difenbachia

- plamistość pierścieniowa liści

Zalecane stężenie: 0,1% (100 ml środka w 100 l wody).

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1 litr na 10 m²

Opryskiwać rośliny po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, zabieg powtarzać kilkakrotnie co 7-10 dni.

goździk, cyklamen

- fuzarioza naczyniowa

Zalecane stężenie: 0,05% (50 ml środka w 100 l wody).

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1 litr na 10 m² .

Opryskiwać rośliny kilkakrotnie po posadzeniu co 7-10 dni.

gerbera, syningia

- fytoftoroza

Zalecane stężenie: 0,05% (50 ml środka w 100 l wody).

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1 litr na 10 m² .

Opryskiwać rośliny kilkakrotnie po posadzeniu co 7-10 dni.

niecierpek

- szara pleśń, plamistość pierścieniowa liści

Zalecane stężenie: 0,1% (100 ml środka w 100 l wody).

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1 litr na 10 m² .

Opryskiwać rośliny po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, zabieg powtarzać kilkakrotnie co 7-10 dni.

pelargonia

- szara pleśń

Zalecane stężenie: 0,1% (100 ml środka w 100 l wody).

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1 litr na 10 m².

Opryskiwać rośliny po wystąpieniu pierwszych objawów choroby.

Zabieg powtarzać kilkakrotnie co 7-10 dni.

Rośliny ozdobne (w gruncie):

cyprysik

- fytoftoroza

Zalecane stężenie: 0,05% (50 ml środka w 100 l wody).

Zalecana ilość wody: 1000 litrów na 1 ha.

Opryskiwać rośliny kilkakrotnie po posadzeniu co 7-10 dni.

róża

- mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, czarna plamistość liści

Zalecane stężenie: 0,1% (100 ml środka w 100 l wody).

Zalecana ilość wody: 1000 litrów na 1 ha.

Opryskiwać rośliny profilaktycznie lub interwencyjnie co 7 dni.

wierzba

- rdza

Zalecane stężenie: 0,1% (100 ml środka w 100 l wody).

Zalecana ilość wody: 1000 litrów na 1 ha.

Opryskiwać rośliny po pojawieniu się pierwszych objawów choroby na liściach.

Rośliny warzywne (w gruncie):

cebula.

- mączniak rzekomy, bakteryjne gnicie cebuli.

Zalecana dawka: 1,5 l/ha.

Zalecana ilość wody: 700-800 l/ha.

Opryskiwać 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym przemiennie z innymi środkami grzybobójczymi o działaniu wgłębnym lub systemicznym.

groch siewny (konserwowy)

- mączniak rzekomy, szara pleśń

Zalecana dawka: 0,8-1,5 l/ha.

Zalecana ilość wody: 700 l/ha.

Wyższą dawkę stosować w okresach podwyższonego zagrożenia roślin chorobami.

Opryskiwać 2-3 razy przed i w czasie kwitnienia roślin.

ogórek

- bakteryjna kanciastość liści, mączniak rzekomy.

Zalecana dawka: 1,5 l/ha.

Zalecana ilość wody: 700 l/ha.

Opryskiwać zapobiegawczo co 7 dni lub według sygnalizacji 4-6 razy w sezonie wegetacyjnym, w zależności od stopnia nasilenia choroby. Środek stosować przemiennie z innymi środkami grzybobójczymi zalecanymi do zwalczania mączniaka rzekomego.

pomidor.

- bakteryjna cętkowatość, alternarioza, zaraza ziemniaka.

Zalecana dawka: 1,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 700-800 l/ha.

Opryskiwać zapobiegawczo co 7 dni lub interwencyjnie 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym. Środek stosować przemiennie z innymi środkami grzybobójczymi o działaniu wgłębnym lub systemicznym.

Rośliny warzywne (pod osłonami):

ogórek

- mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy.

Zalecane stężenie: 0,2% (200 ml środka w 100 l wody).

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 120-150 l/1000m²

Opryskiwać zapobiegawczo lub w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym co 7-10 dni. Środek stosować przemiennie z innymi środkami grzybobójczymi zalecanymi do zwalczania tych chorób.

pomidor

- szara pleśń, bakteryjna cętkowatość, zaraza ziemniaka

Zalecane stężenie: 0,1% (100 ml środka w 100 l wody).

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 120-150 l/1000m²

Opryskiwać zapobiegawczo lub interwencyjnie 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym co 7-10 dni.

Opryskiwać dokładnie całe rośliny.

sałata

Opryskiwanie roślin

- szara pleśń, mączniak rzekomy, mączniak prawdziwy.

Zalecane stężenie: 0,1% (100 ml środka w 100 l wody).

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 70 l/1000m²

Opryskiwać zapobiegawczo lub w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby co 7-10 dni 2-3 razy w sezonie uprawy. Środek stosować przemiennie z innymi środkami grzybobójczymi.

Podlewanie roślin

- rizoktonioza, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń

Zalecane stężenie: 0,1% (100 ml środka w 100 l wody).

Podlewać siewki co 7-10 dni, stosując 100 ml cieczy użytkowej pod roślinę.

Powierzchnie szklane, foliowe, podłóża, przejścia, maty.

- zwalczanie glonów.

Zalecane stężenie: 0,1-0,2% (100 -200 ml środka w 100 l wody).

Odkazaną powierzchnię dokładnie opryskać, stosując 0,1 l cieczy użytkowej na 1m².

OKRES KARENCEJ (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji) – **nie dotyczy**.

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, PSZCZÓŁ I ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu) - **nie dotyczy**

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Odmierzoną ilość środka wymieszać w naczyniu z małą ilością wody, następnie uzupełnić do potrzebnej objętości i dokładnie wymieszać. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową.

Po pracy aparaturę dokładnie wyczyścić.

PRZECHOWYWANIE

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej 0-25°C.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

Unikać zanieczyszczenia oczu.

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.

Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej

Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

Pomoc medyczna

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk - (0-prefiks-58) 301 65 16

Kraków - (0-prefiks-12) 411 99 99,

Lublin - (0-prefiks-81) 740-26-76

Łódź - (0-prefiks-42) 657 99 00,

Poznań - (0-prefiks-61) 847 69 46

Rzeszów - (0-prefiks-17) 866 44 09,

Sosnowiec - (0-prefiks-32) 266 11 45

Warszawa - (0-prefiks-22) 619 08 97,

Wrocław - (0-prefiks-71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -