

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-167/2009d z dnia 27.10.2009 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 29/2009 z dnia 12.03.2009 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:

Sharda Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 101, lokal nr 20, 02-011 Warszawa, Rzeczpospolita
Polska, tel.: (022) 886 9328, fax: (022) 846 8735 e-mail:shardain@vsnl.com.

**Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska**

P r o A g r o A E

Zawartość substancji aktywnej:

imidachlopyrd 1-(6-chloro-3-pirydylometylo)-N-nitro(imidazolidyn-2-ylideno)amina/
(związek z grupy pochodnych imidazoli) – **0,025%**.

**Zezwolenie MRiRW nr R- 29/2009 z dnia 12.03.2009 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R- 167/2009d z dnia 27.10. 2009 r.**



Niebezpieczny dla środowiska

Bardzo toksyczny dla pszczoł.



Uwaga:

- 1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie otulin parków narodowych i rezerwatów**
- 2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin i jego opakowaniem.**

I OPIS DZIAŁANIA

ProAgro AE jest środkiem owadobójczym w formie dyspensera aerozolowego, o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczonym do amatorskiego zwalczania mszycy różano-

szczeciowej, mączlika szklarniowego i wełnowca cytrusowca w niektórych roślinach ozdobnych uprawianych pod osłonami.

W roślinie działa systemicznie.

II ZAKRES STOSOWANIA I DAWKI

1. ROŚLINY OZDOBNE

a) RÓŻA

mszyca różano-szczeciowa

Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.

Aerolizować całą roślinę z odległości 30-40 cm, aby była wilgotna, ale żeby nie spływały z niej krople.

2. ROŚLINY OZDOBNE POD OSŁONAMI

b) GERBERA

mączlik szklarniowy

Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika i powtórzyć po 4-7 dniach

Aerolizować całą roślinę z odległości 30-40 cm, aby była wilgotna, ale żeby nie spływały z niej krople.

3. KAWA

wełnowiec cytrusowiec

Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.

Aerolizować całą roślinę z odległości 30-40 cm, aby była wilgotna, ale żeby nie spływały z niej krople.

UWAGA:

Zachować ostrożność - środek w pojemniku znajduje się pod ciśnieniem.

Środka nie stosować:

- podczas silnego wiatru
- w czasie silnego nasłonecznienia

W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować:

- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia
- kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty
- w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji

W czasie opryskiwania w ogrodach nie dopuścić do przedostania się środka na rośliny konsumpcyjne.

Przed zastosowaniem środka na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.

III OKRES KARENCJI

okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji:

NIE DOTYCZY

IV OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ

okres zapobiegający zatruciu – 30 DNI

V OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT

okres zapobiegający zatruciu

NIE DOTYCZY

VI PRZECHOWYWANIE

Chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej 50° C.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej 0° C i 30° C.

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza pokaż opakowanie lub etykietę.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny – opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Pustych opakowań nie przekłuwać.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

IX POMOC MEDYCZNA

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (0-58) 682 04 04

(0-17) 866 40 25

Kraków – (0-12) 411 99 99

– (0-32) 266 11 45

Lublin – (0-81) 740 89 83

14) 631-54-09

Łódź – (0-42) 657 99 00

– (0-22) 619 66 54

Poznań – (0-61) 847 69 46

(0-71) 343 30 08

Rzeszów –

Sosnowiec

Tarnów (0-

Warszawa

Wrocław –

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji -
Zawartość netto -
Nr partii -