

nr R- 39 /2009 z dnia 27.03.2009 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Scotts Poland sp. z o.o., ul. Ostrobramska 79, 04-175 Warszawa, tel (0-22) 514 22 00, fax: (0-22) 514 22 09.

Producent: Scotts France SAS, 21 Chemin de la Sauvegarde; BP 92; 69134 Ecully, Republika Francja Tel 0033 047 286 6700; fax 0033 047 286 6786.

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

P O L Y S E C T 002 EW

Zawartość substancji aktywnej:

bifentryna /*(Z)*-(1*RS*,3*RS*)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan 2-metylobifenyl-3-ylometylu/ (związek z grupy pyretroidów) - **2 g w 1 litrze środka.**

Zezwolenie MRiRW nr. R-39/2009 z dnia 27.03.2009 roku



niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo - utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Działa bardzo toksycznie na pszczoły w przypadku stosowania w uprawie jabłoni.



Uwaga!

1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów

2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin i jego opakowaniem.

I OPIS DZIAŁANIA

Środek owadobójczy w formie emulsji (olej w wodzie), o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania niektórych przędziorków, wciornastków, mszycy jabłoniowej oraz mączlika szklarniowego w amatorskiej uprawie jabłoni oraz papryki, pomidora, róży i pierwiosnka pod osłonami. Na roślinie działa powierzchniowo.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

ROŚLINY SADOWNICZE

1. JABŁOŃ

mszyca jabłoniowa.

Stosować po wystąpieniu szkodnika, przed kwitnieniem lub bezpośrednio po kwitnieniu drzew.

Zalecana dawka: 10 ml/1 litrze wody.

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 10 l na 100 m².

ROŚLINY WARZYWNE (POD OSŁONAMI)

1. POMIDOR, PAPRYKA.

mączlik szklarniowy.

Stosować po wystąpieniu szkodnika.

Zalecana dawka: 10 ml/1 litrze wody.

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 10 l na 100 m².

ROŚLINY OZDOBNE (POD OSŁONAMI)

1. RÓŻA

przędziorek chmielowiec.

Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.

2. PIERWIOSNEK

przędziorek chmielowiec

Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.

Zalecana dawka: 10 ml/1 litrze wody.

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 10 l na 100 m².

UWAGI:

1. W temperaturze powyżej 20°C zabieg wykonać pod koniec dnia.
2. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
3. Opryskiwanie przeciwko szkodnikom (szczególnie ssącym) wykonać dokładnie ,aby wszystkie części rośliny były pokryte cieczą użytkową.
4. W przypadku stosowania środka w uprawie jabłoni w celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środka nie stosować:
 - Na rośliny uprawne w czasie kwitnienia
 - Kiedy na chronionej uprawie występują kwitnące chwasty
 - W miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji

III OKRES KARENCJI

okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji

JABŁOŃ, POMIDOR, PAPRYKA - 24 GODZINY

RÓŻA, PIERWIOSNEK – NIE DOTYCZY

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT

okres zapobiegający zatruciu

NIE DOTYCZY

OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ

JABŁOŃ – 14 DNI

ROSLINY WARZYWNE I OZDOBNE POD OSŁONAMI – NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, dokładnie wymieszać i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Opróżnione opakowania po środku przepłukać trzykrotnie niewielką ilością wody, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
- Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Opróżnione opakowanie zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM:

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

IX POMOC MEDYCZNA

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (0-58) 682 04 04

Rzeszów – (0-17) 866 40 25

Kraków - (0-12) 411 99 99

Sosnowiec – (0-32) 266 11 45

Lublin – (0-81) 740 89 83

Tarnów - (0-14) 629 95 88

Łódź – (0-42) 657 99 00

Warszawa – (-22) 619 66 54

Poznań – (0-61) 847 69 46

Wrocław – (0-71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -