

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 55/2009 z dnia 04.05.2009 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie: „CHEMA” Spółdzielnia Pracy w Olesinie,
Olesin, ul. Pałacowa 41, 42, 53, 05-311 Dębe Wielkie, tel.: (0-25) 757 78 74, 757 78 72;
fax: (0-25) 758 53 29; e-mail: chema@chema.com.pl.

**Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.**

RE P E N T O L 6 PA

Substancja aktywna:

piasek kwarcowy (dwutlenek krzemu) zawieszony w półpłynnej zawieszynie zawierającej jako główny składnik glinę malarską ,
(związek z grupy tlenków nieorganicznych) - **300g w 1 kilogramie środka.**

Zezwolenie MRiRW nr R-55/2009 z dnia 04.05.2009 r.



Drażniący

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.



Uwaga!

- 1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.**
- 2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin i jego opakowaniem.**

I OPIS DZIAŁANIA

Repentol 6 PA jest środkiem o działaniu odstrasającym ssaki roślinożerne w formie pasty do bezpośredniego użycia, przeznaczonym do ochrony młodych drzew iglastych i liściastych w leśnictwie oraz drzew owocowych przed zgryzaniem ich przez roślinożerne ssaki (jeleniowate i zającowate).

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

MŁODE DZREWKA LIŚCIASTE I IGLASTE

Roślinożerne ssaki (jeleniowate i zającowate).

Zalecana dawka:

2 kg na 1000 sztuk 3-5 letnich drzewek iglastych,

10-15 kg na 1000 sztuk 2-5 letnich drzewek liściastych (w zależności od wielkości drzewek).

Przed użyciem środek dokładnie wymieszać aż do uzyskania konsystencji półpłynnej zawiesiny. Zaleca się także mieszanie w trakcie nanoszenia środka. Ręką zabezpieczoną rękawicą gumową nanosić środek równomiernie cienką warstwą na pędy drzew:

- iglastych - na tegoroczny przyrost pędu głównego

- liściastych - na cały pęd główny, gdy jego grubość nie przekracza 2cm, a wysokość 60-80cm.

Środek stosować w okresie wiosennym lub jesienią po opadnięciu liści.

UWAGI

1. Po wyschnięciu środek utrzymuje się na pędach do 7 miesięcy.

2. Środek stosować w dni bezdeszczowe i w temperaturze nie niższej niż 0°C.

III OKRES KARENCCI

okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji.

NIE DOTYCZY

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, PSZCZÓŁ I ZWIERZĄT

okres zapobiegający zatruciu.

NIE DOTYCZY

V PRZECHOWYWANIE

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze powyżej 0°C.

VI WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Unikać zanieczyszczenia skóry.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
- Opakowanie po środku usuwać jako odpad komunalny.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VII ANTIDOTUM

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

VIII POMOC MEDYCZNA

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (0-58) 682-04-04
 Kraków – (0-12) 411-99-99
 Lublin – (0-81) 740-89-83
 Łódź – (0-42) 657-99-00
 Poznań – (0-61) 847-69-46

Rzeszów –(0-17) 866-40-25
 Sosnowiec –(0-32) 266-11-45
 Tarnów –(0-14) 631-54-09
 Warszawa –(0-22) 619-66-54
 Wrocław – (0-71) 343-30-08

Okres ważności - 2 lata
 Data produkcji -
 Zawartość netto -
 Nr partii -