

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:

Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A., ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna,
tel.: 0-17-241 32 31, fax: 0-17-241 24 17 e-mail: zch@zch.sarzyna.pl

Przedsiębiorca konfekcjonujący środek ochrony roślin:

Scotts Poland Sp. z o. o. , ul. Ostrobramska 79, 04-175 Warszawa,
tel.: (022) 514 22 00 , fax.: (022) 514 22 09

**Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska**

MNISZEK 540 SL

Środek chwastobójczy w formie płynu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych na trawnikach, na boiskach sportowych i polach golfowych.


Zawartość substancji aktywnych:

mekoprop /kwas(±)2-(4-chloro-2-metylofenoksy)propionowy/
(związek z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l

MCPA /kwas (4-chloro-2-metylofenoksy)octowy/
(związek z grupy fenoksykwasów) - 200 g/l

dikamba /kwas 3,6-dichloro-2-metoksybenzoesowy/
(związek z grupy pochodnych kwasu benzoowego) - 40 g/l.
w formie soli potasowych

**Zezwolenie MRiGŻ Nr 289/98 z dnia 10.03.1998 r.
zmienione decyzją MRiRW z dnia 14.02.2001r. ,
decyzją MRiRW Nr R-369/2003p z dnia 13.08.2003r.
oraz decyzją MRiRW Nr R-62/2007 z dnia 08.03.2007 r.**



Szkodliwy

Działa szkodliwie po połknięciu
Działa drażniąco na oczy.



Uwaga!

1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek pobierany jest głównie przez liście chwastów powodując ich deformację, a następnie zahamowanie wzrostu i zamieranie. Pierwsze objawy widoczne są po kilku dniach, a proces obumierania następuje po tygodniu od zastosowania. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza sprzyjająca rozwojowi roślin wzmacnia działanie chwastobójcze środka.

Chwasty wrażliwe np.: babki, gwiazdnica pospolita, komosa biała, koniczyny, mlecze, mniszek pospolity, rdesty, rumianek pospolity, tasznik pospolity.

Chwasty średnio wrażliwe np.: podbiał pospolity, powój polny, bodziszek drobny, fiołek polny..

Chwasty odporne np.: rośliny jednoliścienne, skrzyp, inne chwasty głęboko korzeniące się.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Trawniki, boiska sportowe i pola golfowe.

Środek Mniszek 540 SL stosować w czasie całego okresu wegetacji traw, od wczesnej wiosny do jesieni w okresie intensywnego wzrostu chwastów.

Zalecana dawka: 4 ml środka w 1 l wody na 20 m²,
co odpowiada 20 ml środka w 5 l wody na 100 m²
albo 100 ml środka w 25 l wody na 500 m²

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Środek stosować na całą powierzchnię lub tylko na miejsca silnie zachwaszczone. W przypadku silnego zachwaszczenia może wystąpić konieczność powtórnego zabiegu.

UWAGA.

1. W roku siewu trawnika, można go odchwaszczać gdy trawa osiągnie fazę pełni krzewienia lub po 2 tygodniach od pierwszego koszenia.

OKRES KARENCCI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji) : NIE DOTYCZY

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI (okres zapobiegający zatruciu): 1 dzień

OKRES PREWENCJI DLA ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu): 21 dni

OKRES PREWENCJI DLA PSZCZOŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY

PRZECIWSKAZANIA

Środka nie stosować:

1. W czasie suszy
2. Na rośliny chore, uszkodzone, mokre lub osłabione suszą.
3. W temperaturze poniżej 10°C i powyżej 25°C.
4. Przed zbliżającymi się przymrozkami i deszczami.
5. Na liście i młodą korę drzew, krzewów owocowych i ozdobnych ze względu na możliwość ich uszkodzenia.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzyć ilość środka wykorzystując dołączone naczynie miarowe, włączyć do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą i uzupełnić ją do potrzebnej ilości. Po wlewaniu środka do zbiornika opryskiwacza ciecz wymieszać zgodnie z instrukcją obsługi danego typu opryskiwacza.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny włączyć do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Ciecz użytkową zużyć bezpośrednio po jej sporządzeniu. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Zabieg wykonać w dzień bezwietrzny (ewentualnie podczas słabego wiatru) nie stwarzającego możliwości znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące uprawy i wykonującego zabieg. Rośliny rosnące w sąsiedztwie zabezpieczyć folią plastikową. Po wyschnięciu cieczy folię złożyć górną stroną do środka, aby podczas kolejnego jej użycia czystą (nie opryskaną środkiem) stroną nakładać na zabezpieczane rośliny.

Unikać nakładania cieczy użytkowej na powierzchnię już opryskaną.

Po pracy opryskiwacz dokładnie wymyć wodą, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny włączyć do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

Unikać zanieczyszczenia oczu.

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary i ochronę twarzy.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia opryskiwacza wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.

Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

UWAGA! ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

W przypadku awarii lub jeśli źle się czujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

Pomoc medyczna.

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach, skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk (058) 301 65 16,

Kraków (012) 411 99 99,

Lublin (081) 740 26 76,

Łódź (042) 657 99 00,

Poznań (061) 847 69 46,

Rzeszów (017) 866 44 09,

Sosnowiec (032) 266 11 45,

Warszawa (022) 619 08 97,

Wrocław (071) 343 30 08.

Okres ważności: 3 lata.

Data produkcji -

Zawartość netto -

Numer partii – na opakowaniu