

Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Chimac-Agriphar S.A., Rue de renory, 26 B-4102 Ougree – Belgia, telefon: +32(0)4 385 97 11, fax.: +32(0)4 385 97 49.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Agrosimex Sp.z o.o., ul. Goliany 43 - 05-620 Błędów.
Telefon.:048 66 80 471, fax.: 048 66 80 486, e-mail: agrosimex@wp.pl ,

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

S Y L L I T 6 5 W P

Środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego w ochronie roślin sadowniczych przed chorobami grzybowymi.

Zawartość substancji aktywnej:

dodyna/octan 1-dodecyloguanidyniowy (związek z grupy pochodnych guanidyny) - 65%.

**Zezwolenie MRiRW Nr 48/2002 z dnia 04.07.2002r.,
zmienione decyzją MRiRW Nr R - 95/2002/p z dnia 16.12.2002 r., decyzją
MRiRW Nr R - 149/2004o z dnia 29.03.2004 r. oraz decyzją MRiRW Nr R-348/2007
z dnia 19.07.2007 r.**



Szkodliwy



Niebezpieczny dla środowiska


Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.

Działa drażniąco na skórę.

Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Bardzo toksyczny dla pszczoł w dawce powyżej 1,58 kg/ha.



Uwaga!

- 1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.**
- 2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.**

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Rośliny sadownicze

jabłoń, grusza.

-parch.

Zalecane dawki:

zapobiegawczo

- przed kwitnieniem - 1,5 kg/ha.
- po kwitnieniu - 1 kg/ha.

interwencyjnie

- w czasie infekcji oraz do 72 godzin po infekcji - 1,5-2 kg/ha.

wyniszczająco

- po pojawieniu się plam parcha - 2,25 kg/ha.

Środek stosować wiosną: przed kwitnieniem, w czasie kwitnienia i po kwitnieniu do fazy czerwcowego opadania zawiązków.

Zalecana ilość wody: 750-1000 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości drzew.

UWAGI:

1. Na odmianach wrażliwych na ordzawienie, środek stosować tylko do fazy różowego pąka.
2. Stosując środek po kwitnieniu na odmianach wrażliwych na ordzawienie, nie przekraczać dawki 1 kg/ha.
3. Środek stosować najlepiej od początku wegetacji do około 2 tygodni po kwitnieniu.
4. Zapobiegawczo środek stosować w odstępach co 7-10 dni.

wiśnia, czereśnia.

-drobna plamistość liści drzew pestkowych.

Zalecana dawka: 1,5 kg/ha.

Zalecana ilość wody: 750-1000 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości drzew.

Pierwszy zabieg wykonać bezpośrednio po kwitnieniu. Dalsze 2–3 zabiegi wykonać w odstępach co 10-14 dni. Zabieg wykonać najpóźniej do 1 miesiąca po kwitnieniu.

brzoskwinia.

-kędzierzawość liści.

Zalecana dawka: 7,5 kg/ha.

Zalecana ilość wody: 750-1000 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości drzew.

Środek stosować w okresie bezlistnym, najlepiej w czasie nabrzmiewania pąków.

śliwa.

-torbiel śliw.

Zalecane dawki:

- wiosną przed pękaniem pąków (okres bezlistny) – 7,5 kg/ha
- przed kwitnieniem (faza białego pąka) – 1,5 kg/ha

Zalecana ilość wody: 750-1000 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości drzew.

UWAGI:

1. Środka nie stosować w temperaturze poniżej 6°C oraz nie używać do sporządzania cieczy użytkowej bardzo zimnej wody.
2. Warunkiem skuteczności zabiegu jest dokładne pokrycie drzew cieczą użytkową.
3. Nie stosować mniej niż 400 l cieczy użytkowej na hektar.
4. W przypadku stosowania środka w dawce powyżej 1,58 kg/ha w celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środka nie stosować:
 - na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,
 - kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,
 - w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji): **jablka, gruszki, wiśnie, czereśnie, śliwki - 14 dni, brzoskwinie – nie dotyczy.**

OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu):

- dla dawki powyżej 1,58 kg/ha – **30 dni**

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI I ZWIERZĄT(okres zapobiegający zatruciu): **NIE DOTYCZY.**

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wleciu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

Opróżnione opakowania po środku przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE

Magazynować w suchych i chłodnych miejscach, w pomieszczeniach prawidłowo wentylowanych, wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C, z dala od źródeł ciepła.

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

Pomoc medyczna

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym:

Gdańsk – (0-prefiks-58) 301 65 16

Rzeszów – (0-prefiks-17) 866 44 09

Kraków - (0-prefiks-12) 411 99 99

Sosnowiec – (0-prefiks-32) 266 11 45

Lublin – (0-prefiks-81) 740 26 76

Warszawa – (0-prefiks-22) 619 08 97

Łódź – (0-prefiks-42) 657 99 00

Wrocław – (0-prefiks-71) 343 30 08.

Poznań – (0-prefiks-61) 847 69 46

Okres ważności - 3 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -